

Anus

AJCC 8ème édition

I. Canal anal

T - Tumeur primitive

- Tx** Tumeur primitive non évaluable
T0 Pas de signe de tumeur primitive
Tis Carcinome in situ, maladie de Bowen, lésion intra-épithéliale squameuse de haut grade, néoplasie intra-épithéliale du canal anal (AIN II-III)
- T1** Tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension
T2 Tumeur >2 cm et ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension
T3 Tumeur de plus de 5 cm dans sa plus grande dimension
T4 Tumeur envahissant un ou plusieurs organes de voisinage

N - Extension ganglionnaire régionale

- Nx** Envahissement ganglionnaire non évaluable
N0 Pas d'adénopathie régionale métastatique
N1 Adénopathies régionales métastatiques péri-rectales
N2 Adénopathies unilatérales iliaques internes et/ou inguinale
N3 Adénopathies métastatiques péri-rectales et inguinales et/ou iliaques internes bilatérales et/ou inguinales bilatérales

M - Métastase à distance

- Mx** On ne dispose pas des conditions minimales requises pour apprécier la présence de métastases à distance
M0 Pas de signes de métastases à distance
M1 Présence de métastases à distance

Stadification

Stade	T	N	M
0	Tis	N0	M0
I	T1	N0	M0
II	T2, T3	N0	M0
IIIA	T1, T2, T3	N1	M0
	T4	N0	M0
IIIB	T4	N1	M0
	Tout T	N2, N3	M0
IVA	Tout T	Tout N	M1

II. Marge anal

T - Tumeur primitive

- Tx** Tumeur primitive non évaluable
- T0** Pas de signe de tumeur primitive décelable
- Tis** Carcinome in situ
- T1** Tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension
- T2** Tumeur >2 cm et ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension
- T3** Tumeur de plus de 5 cm dans sa plus grande dimension
- T4** Tumeur envahissant les structures profondes sous dermiques, par exemple : cartilage, muscle strié ou os

N - Extension ganglionnaire régionale

- Nx** Envahissement ganglionnaire non évaluable
- N0** Pas d'adénopathie régionale métastatique
- N1** Adénopathies régionales métastatiques (ganglions inguinaux homolatéraux)

M - Métastase à distance

- Mx** Atteinte métastatique à distance non évaluable
- M0** Pas de signes de métastases à distance
- M1** Présence de métastases à distance (toute adénopathie autre que celle des ganglions régionaux est considérée comme M1)