

Foie

T - Tumeur primitive

- Tx** Tumeur primitive non évaluable
T0 Pas de signe de tumeur primitive
Tis Carcinome in situ, maladie de Bowen, lésion intra-épithéliale squameuse de haut grade, néoplasie intra-épithéliale du canal anal (AIN II-III)
- T1** Nodule unique < 2 cm, pas d'invasion vasculaire
T2a Unique < 2 cm avec invasion vasculaire
T2b Multiples nodules unilobulaires < 2 cm sans invasion vasculaire
T2c Unique < 2 cm sans invasion vasculaire
T3a Unique > 2 cm avec invasion vasculaire
T3b Multiples nodules unilobulaires < 2 cm avec invasion vasculaire
T3c Multiples nodules unilobulaires > 2 cm avec invasion vasculaire
T4a Multiples nodules bilobulaires
T4b Invasion vasculaire d'un gros vaisseau (porte ou hépatique)
T4c Invasion d'un organe adjacent

N - Extension ganglionnaire régionale

- Nx** Envahissement ganglionnaire non évaluable
N0 Pas d'adénopathie régionale métastatique
N1 Adénopathies régionales métastatiques

M - Métastase à distance

- Mx** On ne dispose pas des conditions minimales requises pour apprécier la présence de métastases à distance
M0 Pas de signes de métastases à distance
M1 Présence de métastases à distance

Stadification

Stade	T	N	M
0	Tis	N0	M0
I	T1	N0	M0
II	T2	N0	M0
III	T1, T2, T3	N+	M0
IV	T4 ou	Tout N	M+