

Pénis

Classification UICC TNM des tumeurs malignes, 7ème édition, 2009

T - Tumeur primitive

- Tx** Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive
- T0** Pas de signe de tumeur primitive
- Tis** Carcinome in situ
- Ta** Carcinome verruqueux non infiltrant
- T1** Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial
- T1a** Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial sans invasion des vaisseaux lymphatiques et qui n'est pas « peu différencié » ou « indifférencié »
- T1b** Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial avec invasion des vaisseaux lymphatiques ou qui est « peu différencié » ou « indifférencié »
- T2** Tumeur envahissant les corps spongieux ou caverneux
- T3** Tumeur envahissant l'urètre
- T4** Tumeur envahissant d'autres structures adjacentes

N - Extension ganglionnaire régionale

- Nx** Renseignements insuffisants pour classer l'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux
 - N0** Pas de ganglion lymphatique inguinal palpable ou manifestement augmenté de volume
 - N1** Ganglion inguinal unilatéral palpable mobile
 - N2** Ganglions inguinaux mobiles multiples ou bilatéraux palpables
 - N3** Masse ganglionnaire inguinale fixée ou adénopathie(s) pelvienne(s) unilatérale(s) ou bilatérale(s)
-
- pNx** Renseignements insuffisants pour classer l'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux
 - pN0** Pas de ganglion lymphatique inguinal palpable ou manifestement augmenté de volume
 - pN1** Métastase dans un seul ganglion inguinal
 - pN2** Métastases dans de multiples ganglions inguinaux ou atteinte métastatique inguinale bilatérale
 - pN3** Atteinte métastatique unilatérale ou bilatérale des ganglions lymphatiques pelviens ou extension extra-ganglionnaire des ganglions lymphatiques régionaux

M - Métastase à distance

- Mx** On ne dispose pas des conditions minimales requises pour apprécier la présence de métastases à distance
- M0** Pas de signes de métastases à distance
- M1** Présence de métastases à distance