

Classification cancer de la prostate

Classification TNM

I Classification clinique (cTNM)

T - Tumeur primitive

T : Tumeur primitive

T0 : Absence de tumeur

T1 : Tumeur non palpable ou non visible en imagerie

T1a < 5 % du tissu réséqué* et score de Gleason 6

T1b > 5 % du tissu réséqué¹ et/ou score de Gleason 7

T1c : découverte par élévation du PSA et réalisation de biopsies

T2 : Tumeur limitée à la prostate (apex et capsule compris)

T2a : Atteinte de la moitié d'un lobe ou moins

T2b : Atteinte de plus de la moitié d'un lobe sans atteinte de l'autre lobe

T2c : Atteinte des deux lobes

T3 : Extension au-delà de la capsule

T3a : Extension extra-capsulaire

T3b : Extension aux vésicules séminales

T4 : Extension aux organes adjacents (sphincter urétral, rectum, paroi pelvienne) ou tumeur fixée

N - Extension ganglionnaire régionale

N : Ganglions régionaux

NX : ganglions régionaux non évalués

N0 : Absence de métastase ganglionnaire

N1 : Atteinte ganglionnaire(s) régionale(s)

N1mi : Métastase ganglionnaire < 0,2 cm

M - Métastase à distance

M1a : Ganglions non régionaux

M1b : Os

M1c : Autres sites

II. Classification anatomopathologique (pTNM)

pT0 : Absence de tumeur identifiée après prostatectomie

pT2 : Tumeur limitée à la prostate (apex et capsule compris)

pT2a : Atteinte de la moitié d'un lobe ou moins

pT2b : Atteinte de plus de la moitié d'un lobe sans atteinte de l'autre lobe

pT2c : Atteinte des deux lobes

pT3 : Extension au-delà de la capsule

T3a : Extension extra-capsulaire uni- ou bilatérale incluant le col vésical

T3b : Extension aux vésicules séminales (uni- ou bilatérale)

T4 : Extension aux organes adjacents (sphincter urétral externe, rectum, muscles releveurs de l'anus, paroi pelvienne)