

BRIGATINIB

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie, en oncologie médicale ou en hématologie.**



Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières.**



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Trois présentations sont disponibles sous la forme de boîte de *comprimés pelliculés* :



Rond de couleur blanc dosé à **30mg** (60cp) avec «U3» sur une face



Ovale de couleur blanc dosé à **90mg** (30cp) avec « U7 » sur une face



Ovale de couleur blanc dosé à **180mg** (30cp) avec « U13 » sur une face



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C.**
Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

La dose initiale recommandée de brigatinib est de

- 90mg par voie orale une fois par jour pendant les 7 premiers jours de traitement,
- puis de 180mg une fois par jour en continu.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



Les comprimés de brigatinib sont à avaler entiers avec de l'eau. Les comprimés peuvent être pris avec ou sans aliments.



Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.



Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par brigatinib.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Fatigue, pâleur, saignements, signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	Prenez votre température en cas de doute. En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenez votre médecin. Pratiquez les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Difficulté à respirer, toux	Limitez si possible les contacts avec des personnes ayant une infection contagieuse	Contactez le médecin si ces signes surviennent.
Maux de tête, palpitations, vertiges, bourdonnements d'oreille	Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par anti-hypertenseur vous sera prescrit si besoin.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhée	Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).
Constipation	Buvez régulièrement de l'eau. Pratiquez quelques exercices légers.	Buvez si possible 2 litres d'eau par jour Privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. En cas de constipation prolongée par rapport à vos habitudes, contactez votre médecin
Nausées, vomissements, perte d'appétit	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Inflammation de la bouche	Évitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
Eruptions cutanées	Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Maux de tête, douleurs articulaires et musculaires		En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.
Fatigue, étourdissements, troubles visuels	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.

Des **insomnies**, des **picotements** au niveau des extrémités et une **douleur thoracique** peuvent survenir ainsi que des troubles du foie (selles pâles ou grasses, douleurs abdominales, jaunisse, démangeaisons intenses, urines foncées et douleurs musculaires) : n'hésitez pas à en parler à votre médecin.



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien. Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) : 26 11 2018

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :



- Troubles respiratoires (toux, dyspnée, difficulté à respirer,...)
- Troubles cardiaques (rythme cardiaque lent ou irrégulier, palpitations)
- Troubles visuels (vision floue ou double, baisse de la vision...)



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de brigatinib, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Il est déconseillé de prendre brigatinib pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme vous devez utiliser des méthodes contraceptives efficaces et si vous êtes un homme vous devez prendre les précautions nécessaires. Dans les 2 cas, jusqu'à 4 mois après la dernière prise.



Ce médicament contient du **lactose**. En cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.

REMARQUES