



QU'EST-CE QUE AVAPRITINIB ?

- Anticancéreux utilisé dans le traitement de certains types de cancers digestifs.
- Prescrit et renouvelé par votre médecin spécialiste en oncologie.
- Disponible en pharmacie hospitalière après autorisation.



- Comprimés dosés à 100 mg, ronds, blancs, avec les inscriptions bleues « BLU » d'un côté et « 100 » de l'autre.
- Flacons de 30 comprimés.



- Conservez à une température ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne sortez pas les comprimés du flacon pour les mettre dans un pilulier.
- Lavez vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Ne jetez pas les boîtes entamées, merci de les rapporter à votre pharmacien.


COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?



A remplir avec l'aide
d'un professionnel de
santé**

Renseigné avec

.....
selon l'ordonnance de
...../...../.....

Dose par jour mg	= comprimés
Quand ?h.....	UNE prise par jour le matin en dehors des repas (au moins 1 h avant ou 2 h après la prise de nourriture) de préférence à la même heure chaque jour	
Comment ?		Avalez les comprimés entiers, avec de l'eau, l'un à la suite de l'autre, chaque jour au même moment de la journée. Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre.	

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises
N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin

** Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez vous à votre ordonnance la plus récente.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?

En cas d'oubli depuis moins de 16h, prenez immédiatement la dose oubliée et continuez votre traitement habituellement.

En cas d'oubli depuis plus de 16 h, ne prenez pas la dose manquée ni de dose double. En cas de vomissement, ne prenez pas de nouvelle dose. Prenez simplement la dose suivante comme prévu le lendemain. Pensez à noter tout oubli ou vomissement dans votre carnet de suivi*.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION

Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous consommez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.



Ne prenez pas de **millepertuis**, évitez la prise de **pamplemousse (jus, pulpe)** et la prise de **certaines médicaments contre les brûlures d'estomac** sans avis médical.




Avapritinib® est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement



Utilisez une méthode efficace de contraception pendant votre traitement et pendant au moins 6 semaines après la dernière dose

QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC AVAPRITINIB ?

Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
Nausées, vomissements, perte d'appétit	Mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
Diarrhées	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2 litres d'eau par jour ; Privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...) ; Evitez certains aliments (café, boissons glacées, laitages, alcool, fruits-légumes crus, céréales, gras, épices...).
Constipation	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2 litres d'eau par jour ; Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits et fruits secs)
Fatigue, vertiges, maux de tête	Privilégiez une alimentation saine et hydratation suffisante. Respectez des temps de repos dans la journée mais essayez de conserver une activité même modérée. Soyez prudent pour la conduite automobile.
Gonflement du visage et des membres (œdèmes)	Evitez les vêtements serrés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. En cas de gonflement des jambes, élevez les pieds en position assise et portez des bas de contention. Surveillez régulièrement votre poids.
Eruption cutanée ; sécheresse ; picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	Utilisez un nettoyant doux sans savon et un agent hydratant. Evitez l'eau chaude.  Evitez les expositions au soleil, protégez-vous si vous devez le faire (vêtements, protection solaire écran total...). Ne portez pas de vêtements trop serrés. Evitez si possible les travaux irritants pour les mains, les pansements adhésifs, la station debout et les marches prolongées. Une consultation chez un pédicure-podologue peut être utile.



Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses
- Informez votre médecin dès les premiers signes persistants
- Respectez les mesures de prévention

Contactez rapidement votre médecin en cas d'apparition de :

- Troubles de la vue (vision floue ou trouble, sensibilité à la lumière)
- Maux de tête inhabituels
- Troubles du sommeil
- Troubles de la mémoire
- Changements d'humeur inhabituels, confusion
- Saignements, selles noires
- gonflement, rougeur et douleur de la paume des mains et de la plante des pieds
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Contacts utiles :

Remarques :

* Carnet de suivi disponible sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr
Pour en savoir plus, reportez vous à la notice de votre médicament
Vous avez la possibilité de déclarer tout effet indésirable sur le site signalement-sante.gouv.fr