

DISTILBENE®

Diéthylstilbestrol

INDICATIONS AMM

Le Diéthylstilbestrol est un estrogène de synthèse indiqué dans le traitement du cancer de la prostate hormonodépendant, avancé ou métastatique.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE II). Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance et remboursé par la SS à 100%.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible sous plaquettes thermoformées:

- boîte de 26 comprimés bleus dosés à 1 mg.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C .

POSOLOGIE

La posologie est de 3mg/j soit **1 comprimé 3 fois par jour**.

Cette posologie pourrait être ensuite ramenée à 1 mg par jour.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Déconseillées:

- inducteurs enzymatiques : anticonvulsivants (phénobarbital, phénytoïne, primidone, carbamazépine) ; rifabutine ; rifampicine ; griséofulvine

Nécessitant des précautions d'emploi :

- anticonvulsivants
- oxcarbazépine

A prendre en compte :

- Ciclosporine

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frais, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.	Traitement anti-émétique standard éventuel.
Accidents cardio-vasculaires ou thromboemboliques.	Contrôler le poids, la tension artérielle, la triglycéridémie, la cholestérolémie et la glycémie avant et pendant le traitement. Prudence en cas : d'hypertension, d'hyperlipidémie, de diabète, d'antécédents vasculaires familiaux.	La survenue de prise de poids et d'hyperlipidémies est fréquente. L'apparition des signes suivants nécessite l'arrêt du traitement : augmentation de la tension artérielle, céphalées importantes, migraines, vertiges, troubles visuels ou neurologiques. Interrompre le traitement en cas d'immobilisation prolongée et un mois avant une intervention chirurgicale.

Lithiase biliaire	Surveillance de la fonction hépatique.	Interrompre le traitement en cas d'ictère cholestatique ou d'adénome hépatique (rares).
-------------------	--	---

Ce traitement s'accompagne constamment d'une féminisation chez l'homme (gynécomastie, impuissance, atrophie des organes génitaux externes, diminution de la pilosité). Prudence chez les patients épileptiques. L'exacerbation d'une comitialité antérieure nécessite l'arrêt du traitement.

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS

- Le DISTILBENE® doit être pris **au cours** ou **en dehors des repas** avec un grand verre d'eau, avalez un seul comprimé par prise (1 à 3 fois par jour selon votre posologie).
- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.
- **Contre-indications** : tout patient ayant des antécédents de thrombose ou un terrain favorisant leur survenue (tabagisme important, cardiopathie thrombogène ou décompensée, insuffisance coronarienne, antécédents familiaux d'AVC, migraine avec aura, diabète compliqué d'angiopathies), tout patient présentant une insuffisance rénale chronique ou une affection hépatique sévère ou récente.
- **En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante.** Prendre la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.
- **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**
- **Contactez rapidement le médecin prescripteur** en cas de:
 - céphalées importantes et inhabituelles, troubles oculaires, vertiges, élévation de la tension artérielle, signes cliniques de thrombophlébites ou d'embolie pulmonaire.

Pour une information complète, se reporter au RCP.