

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Ne pas consommer de **pamplemousse**, ni de **jus de pamplemousse**.

Ne pas prendre de **millepertuis**.



Vismodegib

ERIVEDGE®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de carcinomes.


Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en cancérologie.

Il est disponible en pharmacie de ville.

Il est présenté sous forme de flacon de 28 gélules.

Il n'existe qu'un seul dosage :

- ERIVEDGE® 150 mg




Posologie Conseils de prise

Vismodegib
ERIVEDGE®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



La dose recommandée est de 1 gélule de 150 mg par jour.



Conservez hors de portée des enfants.

Le flacon peut se conserver 2 ans à température ambiante.



Contactez rapidement votre médecin si:

- Votre partenaire ou vous-même avez un retard de règle, des saignements inhabituels pendant vos règles, êtes enceinte, ou suspectez une grossesse.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Quelques conseils



Les gélules doivent être avalées entières, pendant ou en dehors d'un repas.



En cas de vomissements ou d'oubli d'une prise, ne pas prendre la dose oubliée, reprendre le traitement à la prochaine dose planifiée.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation du comprimé.



Les femmes enceintes, allaitantes ou susceptibles d'être enceinte doivent porter des gants pour toucher ou manipuler les gélules.



En cas de contamination des vêtements ou des draps (vomissures...), les laver immédiatement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.

Le don du sang et de sperme sont contre-indiqués jusqu'à deux ans après l'arrêt du traitement.










Ne pas prendre en cas de grossesse ou d'allaitement.

Durant le traitement et pendant 2 ans après l'arrêt de celui ci, utiliser deux formes de contraception: une méthode mécanique et une forme de contraception hautement efficace.

Si vous êtes une femme, vous devez faire un test de grossesse supervisé par un professionnel de santé dans les 7 jours précédant le début de votre traitement puis tous les mois durant le traitement.

Si vous êtes un homme, usage systématique du préservatif + spermicide durant le traitement et 2 ans après le traitement.

Tous les patients doivent lire et signer le formulaire d'accord de soin et de contraception de ERIVEDGE. Un carnet de suivi personnalisé vous sera également remis et sera à présenter à votre pharmacien à chaque délivrance.

	Nausées, vomissements	<u>A éviter</u> : aliments frits, gras ou épicés En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 h avant de manger <u>Conseil</u> : Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers et buvez entre les repas
	Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, une alimentation riche en fibre et une activité physique régulière. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour.
	Diarrhée	<u>A éviter</u> : café, boissons glacées, lait, fruits, légumes crus, céréales, pain complet, alcool. <u>A privilégier</u> : féculents, carottes, bananes Buvez au moins 2 L par jour
	Fatigue	Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles. Prudence en cas de conduite de véhicule.
	Douleurs musculaires	Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles. Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
	Prurit	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil. Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
	Perte d'appétit, perte de goût	Mangez les aliments que vous aimez et essayez de prendre régulièrement des petits repas. En cas de perte de poids, prévenez le médecin.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**;