

# ERIVEDGE® vismodegib

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie ou en oncologie médicale** (site ANSM 02/08/2015).

Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.




Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les gélules restantes dans votre poubelle.** Merci de les rapporter à votre pharmacien.

**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement,** veuillez lui rapporter vos boîtes et gélules non utilisées lors du renouvellement suivant.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Une présentation est disponible sous la forme de flacons de 28 gélules roses et grises dosées à 150 mg (4 144,00 €).



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**.

**Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : une gélule de **150 mg une fois/j**.

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Les gélules d'ERIVEDGE® sont à avaler entières avec un **verre d'eau en une prise par jour** au cours ou en dehors d'un repas. **Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**



Les gélules ne doivent pas être ouvertes, ni mâchées ou écrasées.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien



En cas de besoin, les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac (anti-acides et anti-sécrétoires) doivent être pris à distance d'Erivedge®. Demandez conseil à votre pharmacien.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Douleurs articulaires, musculaires</b>	Reposez-vous souvent. Faites des exercices légers, évitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants.	Prenez un comprimé de Paracétamol si nécessaire. Informez votre médecin si les douleurs persistent.
<b>Perte d'appétit, perte de goût, perte de poids</b>	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Fatigue</b>	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
<b>Nausées et vomissements</b>	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
<b>Diarrhée</b>	Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants.
<b>Constipation</b>	Buvez régulièrement de l'eau. Pratiquez quelques exercices légers.	Buvez si possible 2 litres d'eau par jour Privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. En cas de constipation prolongée par rapport à vos habitudes, contactez votre médecin
<b>Démangeaisons</b>	Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.

Une **perte de cheveux** et une **absence de menstruation** peuvent survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.

 Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

### QUELQUES CONSEILS



**Contactez rapidement le médecin** en cas de :

- En cas de retard de règles, si vous êtes enceinte ou suspectez une grossesse.
- Signes faisant suspecter une atteinte hépatique : douleur abdominale, jaunissement de la peau, urines foncées ou démangeaisons.



La prescription nécessite la **signature de l'accord de soins**. Les patients reçoivent un carnet patient résumant les mesures à respecter dans le cadre du **programme de prévention de la grossesse**.



Erivedge® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement est interdit pendant le traitement et au cours des 24 mois qui suivent la dernière dose. Les patientes doivent faire un test de grossesse dans les 7 jours précédant le début du traitement puis tous les 28 jours durant le traitement.



Utilisez 2 méthodes de contraception efficace pendant le traitement et au moins jusqu'à 2 ans (pour les femmes) et 2 mois (pour les hommes) après l'arrêt du traitement.



**N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



**Si vous avez oublié de prendre vos comprimés d'Erivedge®**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale sans la doubler, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Ce médicament contient du lactose. En cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.



Evitez l'**exposition au soleil**

### REMARQUES :

Remerciements : - Groupe VOCC B PL : Observatoire dédié au cancer BPL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, cliniciens, pharmaciens et infirmières d'établissements volontaires B PL, Conseils de l'Ordre B PL, Directions Régionales du Service Médical B PL, OMEDIT B PL, Cancéropôle Grand Ouest, Comité de patients et URPS B PL  
- ICO René Gauducheau Nantes  
- à l'OMÉDIT de Haute-Normandie et au Réseau Onco-Normand