


Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Il faut par exemple **éviter la prise de millepertuis** sous toutes ses formes.

N'oubliez pas de **donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes** (même vendus sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaiteriez prendre à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Panobinostat FARYDAK®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement du myélome multiple chez l'adulte.

Il est prescrit et renouvelé par un **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie et maladies sanguines.

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières**.

Il est présenté sous la forme de plaquettes thermoformées dans des boîtes de 6 gélules opaques. Il existe trois dosages :


- FARYDAK® 10mg (vert clair)
- FARYDAK® 15 mg (orange)
- FARYDAK® 20 mg (rouge)

Posologie Conseils de prise

Panobinostat FARYDAK®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : **20 mg 1 fois/jour** uniquement les jours programmés..

Les gélules FARYDAK ne doivent pas être prises avec de la nourriture. Elles sont à prendre avec un **verre d'eau** en une prise unique. **Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver à température ambiante (inférieure à 25°C), à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.



Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Difficulté à respirer, toux, fièvre
- Palpitations

Quelques conseils



Les gélules sont à avaler entières (ni ouvertes, ni mâchées) par voie orale, avec un verre d'eau et peuvent être prises avec ou sans nourriture, à heure fixe.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Ne pas jeter les boîtes entamées ni les gélules restantes dans votre poubelle. Rappelez-les à votre pharmacien.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



- En cas d'oubli d'une prise de **moins de 12 heures**, prenez la dose.
- En cas d'oubli d'une prise de **plus de 12 heures**, ne prenez pas la dose oubliée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.

Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Il est **déconseillé** de prendre FARYDAK® pendant la **grossesse** ou l'allaitement. Si vous êtes une femme, vous devez utiliser une **méthode contraceptive efficace** jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement. et si vous êtes un homme vous devez prendre les **précautions nécessaires** jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.

	Diarrhées	<u>A éviter</u> : café, boissons glacées, lait, fruits, légumes crus, céréales, pain complet, alcool. <u>A privilégier</u> : féculents, carottes, bananes Buvez au moins 2 L par jour
	Fatigue, maux de tête	Repos fréquent, maintenir des habitudes régulières de sommeil Prudence en cas de conduite de véhicule
	Modification du bilan sanguin	Bilan sanguin à effectuer régulièrement (résultats à communiquer à votre médecin). Si signes infectieux (fièvre, toux) ou saignements inhabituels, prévenez votre médecin.
	Perte d'appétit, perte de poids	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup. Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajoutez du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage rapé, du miel. En cas de perte de poids, parlez en à votre médecin.
	Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez les contacts avec les personnes contagieuses. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. En cas de fièvre > 38°, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.

Une augmentation des enzymes hépatiques et des symptômes cardiaques (palpitations) peuvent survenir pendant le traitement. N'hésitez pas à en parler à votre médecin.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;