

Flutamide

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un **médecin hospitalier** ou de **ville** (LISTE I). Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible :

- boîte de 30 comprimés enrobés dosée à 250 mg

Conservez ce médicament à température ambiante (<30°C), à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, et hors de portée des enfants.

POSOLOGIE

La dose recommandée est de **1 comprimé 3 fois par jour, au moment des repas** (toutes les 8h si possible).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**

Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Bouffées de chaleur	Évitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur	Faites des exercices légers (marche). Restez au frais. Portez des vêtements légers. Buvez régulièrement de l'eau.

Un gonflement et des douleurs à la poitrine peuvent survenir.

Une modification de la coloration des urines de couleur ambre à vert-jaune a été décrite chez quelques patients.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



EULEXINE® doit être pris avec un grand verre d'eau, 3 fois par jour, au moment des repas.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés d'Eulexine®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Evitez l'exposition au soleil pendant le traitement et utilisez un écran total (votre peau pourrait réagir de façon exagérée).



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- bleuissement de la peau (cyanose).
- douleur abdominale, démangeaisons, jaunissement de la peau ou urines foncées.