

Flutamide

INDICATIONS AMM

Le flutamide est un agent antiandrogène non stéroïdien, spécifique des récepteurs androgéniques, qui induit une régression du cancer prostatique en bloquant, au niveau de ces récepteurs, l'activité des androgènes.

Il est indiqué dans le traitement du cancer de la prostate avec métastases.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance et remboursé par la SS à 100%.

PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible :

- boîte de 30 comprimés enrobés dosés à 250 mg.

Conservez ce médicament à température ambiante (<30°C), à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, et hors de portée des enfants.

POSOLOGIE

La dose recommandée est de **1 comprimé 3 fois par jour**, au moment des repas, toutes les 8 heures si possible (pour maintenir des taux stables), en traitement continu.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Nécessitant des précautions d'emploi : Warfarine, en raison de l'augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral : risque hémorragique. Un contrôle plus fréquent du taux de prothrombine, une surveillance de l'INR, une adaptation de la posologie de l'anticoagulant oral, pendant le traitement par le flutamide et 8 jours après son arrêt, sont donc recommandés.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Éviter les aliments frais, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.	Traitement antiémétique standard éventuel.
Bouffées de chaleur	Éviter les déclencheurs comme l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur.	Bien s'hydrater, rester au frais, porter des vêtements légers.
Atteinte hépatique	Contrôle des transaminases avant la mise en route du traitement et périodique.	Arrêt du traitement si transaminases > à 3 fois la normale.
Méthémoglobinémie	En cas de cyanose : doser la méthémoglobinémie.	Arrêt si méthémoglobinémie > 5%. Voir avec l'oncologue pour la suite du traitement.

Une photosensibilisation est possible : éviter l'exposition au soleil.

Une gynécomastie et une sensibilité mammaire peuvent survenir pendant le traitement.

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS

- Flutamide doit être pris avec un grand verre d'eau 3 fois par jour au moment des repas.
 - Ne pas laisser à portée des enfants.
 - Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
 - Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.
 - **En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante.** Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.
 - **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**
 - Eviter l'exposition au soleil pendant le traitement et utiliser un écran total (la peau peut réagir de façon exagérée).
- Contactez rapidement le médecin** en cas de :
- Signes faisant suspecter une atteinte hépatique (douleurs abdominales, ictère, urines foncées, prurit), pour doser les transaminases.
 - cyanose

Pour une information complète, se reporter au RCP.