

HEXASTAT®

Altrétamine

INDICATIONS AMM

L'*altrétamine* est un agent alkylant indiqué en 2ème ligne du cancer de l'ovaire et du cancer bronchique à petites cellules.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, en rétrocession.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une présentation est disponible:

- gélules violettes transparentes à 100 mg, en blister de 5 gélules, par boîtes de 25.

Conservation dans l'emballage d'origine, à température ambiante, sans dépasser + 25°C.

POSOLOGIE

La dose totale quotidienne doit être répartie en plusieurs prises données **après les repas et avant le coucher**.

Les posologies habituelles sont les suivantes :

- En monothérapie, la dose habituelle est de 260 mg/m² par jour, pendant 14 à 21 jours consécutifs. A répéter tous les 28 jours.

- En cas d'association, la dose indiquée en monothérapie peut être diminuée en fonction de l'association avec un ou plusieurs cytostatiques ou cytolytiques, habituellement 150 mg/m²/j pendant 8 à 14 jours. A répéter tous les 28 jours.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : vaccin contre la fièvre jaune, phénytoïne à visée prophylactique.

Associations déconseillées : autres vaccins vivants atténués.

Pour les vaccins inactivés, il est préférable d'attendre un délai de 3 mois après la chimiothérapie (risque de diminution de l'activité du vaccin sans augmentation des effets indésirables).

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Anémie, leucopénie, thrombopénie	Surveillance hématologique avant et après chaque cure.	Réversibles en 1 à 2 semaines : voir avec l'oncologue pour un éventuel report du prochain cycle.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments fris, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.	Un protocole antiémétique est recommandé. L'association d'un sédatif léger est recommandée si la prise se fait au coucher.
Diarrhée	Eviter le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. Traitement symptomatique en complément d'une réhydratation orale.

Troubles neurologiques	Fréquents si utilisation prolongée. Un bilan neurologique régulier est recommandé.	Réversibles : arrêt possible pendant 15 jours et reprise à dose réduite à voir avec l'oncologue. La pyridoxine (Vit B6) est déconseillée. Prudence en cas de conduite de véhicule.
Allergie : rash cutané, prurit, eczéma		Utilisation d'antihistaminiques.

Une alopecie réversible à l'arrêt du traitement peut survenir.

Une aménorrhée ou une azoospermie peuvent survenir.

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS

- Les gélules sont à prendre par voie orale avec un grand verre d'eau, après les repas et avant le coucher. En général, 3 à 4 prises par jour.

- Les gélules ne doivent pas être ouvertes, ni mâchées.

- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.

- Ne pas jeter les emballages ni les gélules à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.

- Ne pas laisser à la portée des enfants.

- Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

- Ne pas prendre HEXASTAT® en cas de grossesse et d'allaitement. Pour les femmes en âge de procréer et pour les hommes traités par HEXASTAT®, une méthode de contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.

- **En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante.** Prendre la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.

- Conseiller aux hommes d'uriner en position assise.

- En cas de contamination des vêtements ou des draps (vomissements...), les laver immédiatement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).

Contactez rapidement le médecin en cas de :

- signes infectieux pour réaliser une NFS en urgence.

- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang

- troubles neurologiques (paresthésies, hallucinations, dépression, somnolence ou insomnie)

Pour une information complète, se reporter au RCP.