

Contacts  
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D'INFORMATION  
SUR LES MÉDICAMENTS  
« PROFESSIONNELS DE SANTÉ »

Palbociclib IBRANCE®



Notes personnelles

## Type de produit, indications et conditions de prescription

- Le palbociclib est une thérapie ciblée, inhibiteur de tyrosine kinase CDK4/6.
- Indications 2017 : cancer du sein avancé ou métastatique positif aux récepteurs hormonaux sans surexpression des récepteurs HER2 :
  - ✓ En association à un inhibiteur de l'aromatase
  - ✓ En association au fulvestrant chez les femmes ayant été traitées antérieurement par hormonothérapie
- Chez les femmes en pré/périménopause, un traitement par agoniste LH/RH doit être associé.
- Posologie usuelle : 125mg par jour pendant 21 jours, tous les 28 jours
- Dosage disponible : Gélules à 75 mg, 100 mg ou 125 mg.
- Modalités de prise : Le palbociclib doit être avalé en entier (ni écrasé, ni mâché) avec un verre d'eau au cours d'un repas de préférence à la même heure.
- Conditions de prescription et de délivrance :
  - Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou hématologie.
  - Dispensation exclusivement dans les pharmacies hospitalières.

## Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker les gélules dans un pilulier.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante à l'heure habituelle sans augmenter celle-ci. Noter l'oubli.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la suivante. Noter l'incident.



## Alertes

- Les femmes et les hommes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 3 semaines chez les femmes et 14 semaines chez les hommes après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)
- [Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteurs du CYP 3A4](#)
- L'absorption de substances augmentant le pH gastrique (IPP, antiH2) peut diminuer l'absorption du médicament. Si besoin, recours à des antiacides d'action rapide à décaler de la prise du palbociclib.

## Gestion des principaux effets indésirables

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

### PREVENTION

### CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

#### ▸ Fréquents

#### **Neutropénie, thrombopénie, anémie**

Hygiène générale.  
Au cours des deux premiers cycles : NFP à J1, J14 et J21 ;  
Cycles suivants : NFP à J1  
Si absence de neutropénie au cours des 6 premiers cycles :  
NFP tous les 3 mois

Alerter le médecin prescripteur en cas de température > 38 °5C qui décidera de la conduite à tenir. Surveillance des signes évocateurs d'infection et de saignements

#### **Alopécie Diarrhée**

Possible, partielle

Eviter les aliments épicés et frits.  
Eviter le café, le lait, l'alcool.  
Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)

Réévaluer les traitements anti-diarrhéiques

#### **Nausées / vomissements**

Eviter les aliments épicés et frits.  
Eviter le café, le lait, l'alcool.  
Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)

Réévaluer les traitements et/ou antiémétiques.

#### **Stomatite**

Rappel au patient d'avoir une bonne hygiène buccale, utilisation d'une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas et qu'il évite les aliments acides, épicés et irritants.

Prescription de bains de bouche au bicarbonate, sans alcool.

#### **Fatigue**

Conservé une activité physique modérée

Prudence en cas de conduite de véhicule.

#### **Eruption cutanée**

Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains.  
Utiliser un savon doux et appliquer une crème hydratante et/ou émolliente.

Alerter le médecin prescripteur qui décidera ou non de la modification du traitement

*Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament*