

JAKAVI® ruxolitinib

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en hématologie, en cancérologie** ou aux **médecins compétents en maladies du sang**.



Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien à la fin du traitement.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Quatre présentations sont disponibles sous la forme de flacon de 56 comprimés blanc dosés à :



«NVR» et L5
5mg (1888€)



«NVR» et L10
10mg (3118 €)



«NVR» et L15 gravés
15mg (3118 €)



«NVR» et L20
20mg (3118 € HT)



Conservez ce médicament à une **température ambiante inférieure à 25°C**, et **1 mois** après ouverture. **Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants**.

MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : **15 mg ou 20 mg deux fois par jour**.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



Les comprimés de JAKAVI® sont à avaler avec un **verre d'eau en deux prises par jour** au cours ou en dehors des repas. **Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**



Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués avant d'être avalés.



Le pamplemousse et le pomelo (jus, pulpe) doivent être évités pendant votre traitement par JAKAVI®.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Pâleur, fatigue, faiblesse, vertiges, essoufflements, sang dans selles	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	Prévenez votre médecin. Pratiquez les bilans sanguins prescrits par votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Bleus, saignements inhabituels, maux de tête, faiblesse, paralysie, sang dans les selles ou dans les vomissements.	Pratiquez les bilans sanguins. En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. L'utilisation des thermomètres rectaux est à éviter. Certains médicaments sont déconseillés (aspirine, ibuprofène...).	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines
Signes d'infection : Fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires.	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.
Troubles au niveau du foie : nausées, vomissements, diarrhées, selles pâles ou grasses, douleurs abdominales, fatigue, perte d'appétit, jaunisse, démangeaisons intenses, urines foncées et douleurs musculaires.	Un bilan du foie doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	En cas d'anomalies des résultats des analyses du foie, prenez contact avec votre médecin.
Maux tête, palpitations, étourdissements, Bourdonnements d'oreilles	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux: potassium, calcium, magnésium, ...) et de votre tension.	Prévenez votre médecin si ces signes surviennent ou s'amplifient.

Une prise de poids, des gaz gastro-intestinaux et une augmentation du cholestérol peuvent survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste, pharmacien(ne) ou infirmier(ères).

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :

- bleus inexplicables, saignements inattendus, essoufflement, pâleur
- fièvre, frisson ou autres symptômes infectieux, toux chronique, sueurs nocturnes
- éruption cutanée douloureuse et/ou cloques
- perte ou prise de poids
- confusion, perte d'équilibre, maladresse, difficulté à parler, faiblesse, vision brouillée



Il est déconseillé de prendre JAKAVI® pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace et si vous êtes un homme vous devez prendre les précautions nécessaires.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de JAKAVI®, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise au moment normalement prévu pour la prochaine dose. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Ce médicament contient du lactose. En cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.

REMARQUES :

Pour une information complète, se reporter au RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) du 08/06/2018.