

MEKTOVI® (binimetinib) BRAFTOVI® (encorafenib)

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ces médicaments sont prescrits et renouvelés par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie ou en oncologie médicale**. Ils sont disponibles dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances.

Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



Votre pharmacien peut vous conseiller pour la prise de vos traitements.



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les médicaments restants dans votre poubelle.

Merci de les rapporter à votre pharmacien.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION

MEKTOVI® (binimetinib)



Comprimés jaunes non sécables, **dosés à 15 mg** portant un « A » stylisé et l'inscription « 15 »

(boîte de 84 comprimés, 2573 € TTC)



Conservez ce médicament à **température inférieure à 30°**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

BRAFTOVI® (encorafenib)



Gélules existantes sous 2 formes :

- **dosées à 50 mg**, de couleur chair et orange portant l'inscription « LGX 50mg »

(boîte de 28 gélules, 613 € TTC)



- **dosées à 75 mg**, de couleur chair et blanche portant l'inscription « LGX 75mg »

(boîte de 42 gélules, 1 340 € TTC)

MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin oncologue, en fonction de la réponse au traitement. **N'arrêtez ou ne modifiez jamais le rythme d'administration de votre traitement sans avis médical.**

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.






A titre d'information, la dose habituelle est de :

- **3 comprimés** de MEKTOVI® (binimetinib) soit 45 mg, **le matin et le soir**
- **6 gélules (à 75 mg) de BRAFTOVI®** (encorafenib) soit 450 mg **une fois par jour** (matin ou soir)



A remplir avec l'aide de votre pharmacien ou médecin

Document renseigné le :...../...../..... avec Dr.....

MEKTOVI®	BRAFTOVI®
Dose par jour	
.....mg matin et soirmg
Nombre de comprimés et quand ?	
.....comprimés à 15 mg  Le matin àh..... et Le soir àh.....gélules à 75 mg  àh..... gélules à 50 mg  àh.....
Comment ?	
 Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre.  A avaler avec un grand verre d'eau	

Si vous avez oublié de prendre:

- **MEKTOVI®** (binimetinib) **depuis moins de 6 heures** : prenez la dose et poursuivez le traitement à l'heure habituelle.
- **BRAFTOVI®** (encorafenib) **depuis moins de 12 heures** : prenez la dose et poursuivez le traitement à l'heure habituelle.



Si cela fait plus de 6h pour MEKTOVI® ou plus de 12h pour BRAFTOVI®, ne prenez pas le médicament. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.

Notez-le dans votre carnet de suivi*!

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Exemples : le **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...) est déconseillé ; le **pamplemousse** (jus, pulpe) est à éviter pendant le traitement.

Précisez à votre médecin, les **médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance)** que vous prenez ou que vous souhaitez prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Troubles de la vision, ou œil rouge et douloureux	Examen ophtalmologique initial en cas d'antécédent.	Prévenez immédiatement votre médecin en cas de vision floue, de halo lumineux, ou de point de couleur , de sensibilité à la lumière, mais aussi de douleur oculaire et/ou œil rouge.
Troubles cardiaques	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, échographie et tension).	Prévenez votre médecin dès l'apparition de signes comme vertiges, fatigue, étourdissement, palpitations, difficulté respiratoire, augmentation du rythme cardiaque, gonflement des jambes, tension anormalement élevée.
Modification du bilan sanguin	Une analyse de sang doit être effectuée régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	Pratiquez les bilans sanguins prescrits par votre médecin. Contactez votre médecin en cas d'anomalie du bilan.
Saignements inhabituels	Certains médicaments sont déconseillés (aspirine, ibuprofène...). Prévenez votre médecin si vous prenez habituellement des médicaments qui modifient la coagulation du sang (Coumadine®, Previscan®, Sintrom®, Kardegic®, clopidogrel Plavix®, Brilique® ...). L'utilisation des thermomètres rectaux est à éviter.	Prévenez votre médecin en cas de maux de tête, vertiges, maux de ventre , en cas de saignements inhabituels et/ou fréquents notamment dans les selles, les urines ou les vomissements.
Nausées et vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de 2 vomissements par jour).
Diarrhées, douleurs abdominales	Consommez avec modération le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, bouillons, boissons gazeuses, thé ou tisanes autorisés en prenant garde au risque d'interaction). Privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).
Lésions cutanées, Eruptions Photosensibilité	Préférez un savon doux pour la toilette. Limitez l'exposition au soleil.	Utilisez une crème hydratante en cas de démangeaisons. En cas d'apparition de lésions sur la peau ou de réactions importantes, contactez votre médecin qui pourra adapter le traitement.
Douleurs articulaires et musculaires	Faites des exercices légers et buvez abondamment.	Contactez votre médecin traitant en cas de symptômes incommodes tels que crampes, douleurs ou difficultés à la marche.
D'autres effets peuvent survenir, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien.		

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :



- Saignement important
- Eruption cutanée généralisée
- Troubles de la vision
- Difficultés à respirer, toux, fièvre
- Palpitations, accélération du rythme cardiaque, gonflement des jambes



Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire : **crème solaire indice 50+**, **vêtements longs.**



Ce médicament contient du lactose. En cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.



Ne prenez pas ces médicaments pendant la grossesse et l'allaitement. Associez deux méthodes de contraception efficaces (contraception hormonale ET contraception à effet barrière (préservatif, stérilet) pendant la durée du traitement et 1 mois après son arrêt.

REMARQUES :