

PURINETHOL®

Mercaptopurine

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un **médecin hospitalier** ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible:

- comprimés sécables jaune pâle dosés à 50 mg par flacon de 25.

A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité

Le flacon est muni d'un bouchon de sécurité.

POSOLOGIE

La dose sera établie en fonction de votre surface corporelle et de votre tolérance à ce médicament.

La dose est strictement personnelle et vous sera donnée par votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**

Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecins.
Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires: aspirine, ibuprofène...	En cas de saignement important, contacter le médecin prescripteur.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Plaies douloureuses dans la bouche	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Maintenir une bonne hygiène buccale.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez le médecin .

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



Les comprimés sont à prendre avec un grand verre d'eau, 15 à 30 minutes avant un repas.
Ne pas écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas laisser à portée des enfants



Vous ne devez pas consommer de boissons alcooliques pendant la prise de PURINETHOL® (sauf si votre médecin vous indique que vous pouvez le faire).



Pendant le traitement, il est important de boire davantage d'eau pour maintenir le bon fonctionnement du rein.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Purinethol®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Ne pas prendre PURINETHOL® en cas de grossesse et d'allaitement. Utilisez une méthode de contraception efficace pendant le traitement.



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.

Contactez rapidement le médecin en cas de :



- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...).
- douleurs abdominales, jaunissement de la peau, urines foncées, démangeaisons.
- coloration noire des selles, saignements de nez, crachats de couleur rouge.