

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Lenalidomide

REVLIMID®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement du myélome multiple, des syndromes myélodysplasiques et du lymphome à cellules du manteau.


Il est prescrit par un médecin spécialiste en oncologie ou par un médecin compétent en cancérologie.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières.

Il est présenté par boîtes de 21 gélules, sous plaquettes thermoformées de 7.

Il existe 5 dosages:

- REVLIMID® 2,5 mg
- REVLIMID® 5 mg
- REVLIMID® 10 mg
- REVLIMID® 15 mg
- REVLIMID® 25 mg



Posologie Conseils de prise

Plan de prise

La posologie vous sera donnée par le médecin.

Les gélules de Revlimid doivent être prises **environ à la même heure**, au cours ou en dehors d'un repas.

Le traitement est parfois pris en association avec de la **dexaméthasone**.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Contactez rapidement votre médecin en cas de:

- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons...)
- Apparition de selles noires, de saignements de nez et de crachats comportant du sang
- Essoufflement anormal, douleurs thoraciques, gonflement, rougeurs ou douleurs au niveau des bras ou des jambes.

Lenalidomide REVLIMID®

Quelques conseils



Les gélules sont à avaler entières par voie orale, avec un verre d'eau, au cours ou en dehors des repas, à la même heure.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rappelez-les à votre pharmacien.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.










Si vous avez oublié une prise depuis moins de 12 heures, prendre cette dose manquante. **Au-delà de 12 heures** après un oubli, ne pas prendre la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain.



Ne pas prendre en cas de grossesse et d'allaitement. Pour les hommes traités, une méthode de contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 1 semaine après l'arrêt du traitement. Pour les femmes, une contraception efficace doit être utilisée pendant 4 semaines avant le début du traitement, pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 4 semaines après l'arrêt du traitement. Un test de grossesse doit être réalisé toutes les 4 semaines et dans les 3 jours précédents une consultation.

Principaux effets indésirables

	Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. Contactez le médecin en cas de signes infectieux.
	Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires. En cas de saignement important, contactez le médecin prescripteur
	Crampes musculaires	Hydratez-vous fréquemment, ne faites pas de gestes répétitifs.
	Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil. Protection solaire : écran total. Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
	Constipation	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour, privilégiez une alimentation riche en fibre et une activité physique régulière. En cas de constipation prolongée, contactez votre médecin.
	Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Buvez au moins 2L/j et privilégiez les féculents, les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenez votre médecin.
	Fatigue, vertiges, somnolence	Repos et exercices légers. Ne conduisez pas de véhicule motorisé lorsque vous vous sentez fatigué. Prise le soir conseillée.
	Troubles de la coordination, faiblesse musculaire	Des paresthésie douloureuses des pieds et des mains et/ou un déficit de la sensibilité des jambes peuvent apparaître. Informez votre médecin dès la survenue de ces symptômes. Adaptation de la dose.
	Complications cardiovasculaires	Un traitement préventif en fonction du risque. Consultez le médecin en cas de survenue de symptômes tels qu'essoufflement, douleur thoracique, gonflement des bras ou jambes.
	Autres	Toux, difficultés à respirer . Troubles de la vision et de l'audition