

TAGRISSO® osimertinib

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie ou en oncologie médicale**. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances.

Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



Votre pharmacien peut vous conseiller pour la prise de votre ou vos traitement(s).



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les médicaments restants dans votre poubelle.

Merci de les rapporter à votre pharmacien.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Deux présentations disponibles en boîte de 30 comprimés pelliculés (6 015,13€ TTC) :



Comprimés ronds, beiges, dosés à 40 mg, portant l'inscription « AZ40 » sur une face



Comprimés ovales, beiges, dosés à 80 mg, portant l'inscription « AZ80 » sur une face



Conservez ce médicament à **température ambiante**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : **80 mg/j**. Le comprimé de TAGRISSO® (osimertinib) est à avaler avec un verre d'eau en **une prise de préférence chaque jour à la même heure** ou cours ou en dehors d'un repas. Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

Si vous avez des difficultés à avaler, vous pouvez mélanger le médicament avec 50 ml d'eau plate : mettre le comprimé dans l'eau, sans l'écraser, remuez jusqu'à ce qu'il se soit dispersé en très petites particules, buvez le liquide puis rincez le verre avec de nouveau 50 ml d'eau plate et buvez-le.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

La prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...) est **formellement contre-indiqué**.



Précisez à votre médecin, les **médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance)** que vous prenez ou que vous souhaitez prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.




En cas de traitement contre les brûlures d'estomac, respectez les délais de prise recommandés. Demandez conseil à votre pharmacien.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhées	Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, bouillons, boissons gazeuses, thé ou tisanes autorisés en prenant garde au risque d'interaction). Privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).
Difficulté à respirer, toux	Limitez si possible les contacts avec des personnes ayant une infection contagieuse	Contactez le médecin si ces signes surviennent.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Rougeur de la peau, acné, démangeaisons, assèchement...	Préférez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil, utilisez une protection solaire écran total.	En cas de symptômes persistants ou gênants, prévenez le médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Modification du bilan sanguin	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	Prenez votre température en cas de doute. En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenez votre médecin. Pratiquez les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Inflammation et rougeur du pourtour des ongles	Evitez de vous ronger les ongles. Limitez le contact prolongé avec de l'eau. Evitez ou limitez les produits de manucures. Evitez les travaux manuels sans port de gants protecteurs.	Effectuez une toilette soignée des ongles par un lavage des mains à l'eau et au savon, en insistant sur le pourtour des ongles et en évitant de frotter trop fort. Veillez à bien sécher le pourtour des ongles. En cas de symptômes persistants ou gênants, prévenez le médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Inflammation de la bouche	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
Douleurs extrémités Symptômes cardiaques	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,...).	Prévenez votre médecin en cas d'apparition de ces signes.
Affections oculaires	Surveillance régulière.	Prévenez votre médecin en cas d'inflammation de l'œil, larmolement, sensibilité à la lumière, vision trouble, douleur oculaire et/ou œil rouge.

 Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer, toux, fièvre
- Palpitations
- Affections oculaires



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis de votre médecin prescripteur.

En cas d'oubli d'une prise de **moins de 12 heures** : prenez immédiatement la dose oubliée et poursuivez ensuite votre traitement comme d'habitude.



En cas d'oubli d'une prise de **plus de 12 heures** : ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Evitez l'exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.



Il est **déconseillé de prendre TAGRISSO® (osimertinib) pendant la grossesse et l'allaitement.**

Utilisez une méthode de contraception efficace pendant la durée du traitement et après son arrêt (pendant au moins 2 mois pour les femmes et 4 mois pour les hommes). Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

REMARQUES :

Pour une information complète, se reporter à la notice et au RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) du 07/09/2018.

Remerciements : - Groupe VOCC B PL : OMIT BPL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, cliniciens, pharmaciens et infirmières d'établissements volontaires B PL, l'Ordre des Pharmaciens B PL, les Directions Régionales du Service Médical B PL, les Comités Régionaux du Médicament et des Dispositifs Médicaux B PL et le Cancéropôle Grand Ouest.
- à l'ICO R Gauducheau Nantes et au CH de Lannion