

**Qui peut prescrire TALZENNA® ?** : Ce médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste expérimenté dans le traitement du cancer du sein.

**Où se procurer TALZENNA®** : Disponible uniquement en pharmacie hospitalière.

### Formes/présentations :

- Boite de 30 gélules de couleur orange et blanc dosées à 1 mg (6100€ la boîte)
- Boite de 30 gélules de couleur jaune et blanc dosées à 0.25mg (2033€ la boîte)



**Comment prendre TALZENNA® ?** : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin. La posologie recommandée est de **1mg par jour, soit 1 gélule de 1 mg.**



Les gélules de TALZENNA® sont à avaler entiers, **en une prise par jour, avec un verre d'eau, de préférence à la même heure chaque jour, pendant ou en dehors du repas.**



Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de TALZENNA®.



**En cas d'oubli** : si vous avez oublié une prise de médicaments, ou en cas de vomissement, **pas de prise supplémentaire. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain.** Notez cet oubli dans le carnet de suivi.

### Comment conserver TALZENNA® ? :

Conserver les comprimés dans son emballage d'origine et à l'abri de l'humidité.

### Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses. **Informez votre dentiste des risques de saignements**



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration** ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.



**TALZENNA® n'est pas recommandé pendant la grossesse ou l'allaitement.** Chez les patients ayant des rapports sexuels avec des femmes en âge de procréer, un préservatif doit être utilisé associé à une autre méthode de contraception hautement efficace pendant le traitement et pendant les 4 mois qui suivent la dernière prise.

## Quels sont les effets secondaires de TALZENNA® ?

*Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun*

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
<b>Diminution des globules blancs dans le sang servant à la lutte contre les infections</b> Fatigue (anémie)	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie. Reposez vous souvent	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire. Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.
<b>Perte d'appétit, dysgueusie, nausées, vomissements</b>	Mangez ce que vous aimez en plusieurs petites collations par jour. Buvez beaucoup. Évitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement.	En cas de vomissement, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2h avant de manger. En cas de nausées, évitez la position allongée. En cas de symptôme persistants ou en cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
<b>Céphalées, vertiges</b>		Informez votre médecin.
<b>Chute des cheveux</b>	Limitez les soins agressifs : teinture et permanente	Parlez-en à votre médecin, des solutions peuvent vous être proposées.

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : [3c@ch-saintonge.fr](mailto:3c@ch-saintonge.fr)  
3C@ch-saintonge.fr