

# VERCYTE®

Pipobroman

## INDICATIONS AMM

Le pipobroman est un agent alkylant indiqué dans le traitement de la Polycythémie vraie (maladie de Vaquez).

## CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance et remboursé par la SS à 100%.

## PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible sous plaquettes thermoformées :  
- boîte de 30 comprimés blancs dosée à 25 mg

Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, et hors de portée des enfants.

## POSOLOGIE

### Traitement d'attaque :

- 1 mg/kg/jour, soit 2 à 3 comprimés en prises fractionnées.

(Si au bout d'un mois de traitement d'attaque à 1 mg/kg/j on n'obtient pas une réponse hématologique satisfaisante, on peut passer à des doses de 1,5 à 3 mg/kg/j, sous couvert d'une surveillance hématologique stricte.)

### Traitement d'entretien :

- Celui-ci est habituellement entrepris lorsque l'hématocrite a été ramené à 50-55 %.

La dose quotidienne sera alors de 0,1 à 0,2 mg/kg.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Pour les vaccins inactivés, il est préférable d'attendre un délai de 3 mois après la chimiothérapie (risque de diminution de l'activité du vaccin sans augmentation des effets indésirables).

## PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frais, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.	Traitement antiémétique standard éventuel.
Diarrhée	Eviter le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. Traitement symptomatique en complément d'une réhydratation orale.
Allergie : rashes cutanés	Utiliser un savon doux et un agent hydratant. Eviter les expositions au soleil	

Modifications du bilan sanguin	Surveillance hématologique : myélogramme et hémogramme avant le début du traitement, puis hémogramme deux fois par semaine.	Suspension du traitement à voir avec l'oncologue si leucopénie ou thrombopénie. Une anémie éventuelle disparaîtra, en général, avec de petites transfusions de sang et la réduction de la posologie. Une chute du taux d'hémoglobine, une augmentation de la bilirubinémie, une réticulocytose feront arrêter le traitement.
--------------------------------	---	--

### RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS

- VERCYTE® doit être pris avec un grand verre d'eau indifféremment pendant ou en dehors des repas.
- Ne pas laisser à portée des enfants.
- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.
- Ne pas prendre VERCYTE® en cas de grossesse et d'allaitement. Utiliser un moyen de contraception efficace.
- **En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante.** Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.
- **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**
- Conseiller aux hommes d'uriner en position assise.
- En cas de contamination des vêtements ou des draps (vomissements...), les laver immédiatement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).
- **Contactez rapidement le médecin** en cas de :
  - signes infectieux pour réaliser une NFS.
  - apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang.

Pour une information complète, se reporter au RCP.